Chapter 25

ヘテロ環化合物 (その1)

重要

Text には Cu⁺ 触媒なしでも進行すると書いてあるが、置換基のついているエポキシドでは Cu⁺ 触媒をいれないと反応しない。

練習問題 25-2 (p 1212)

練習問題 25-4 (p 1213)

練習問題 25-6 (p 1214); 類似した問題 27-C (p 1243)

Paal-Knorr合成法 メカニズムは 練習問題 25-9 (p 1217) を参照

練習問題 25-10 (p 1217)

上記反応を含んでいる。

トビックス

LDL に含まれている不飽和脂質の酸化生成物 (動脈硬化を増悪させる因子のひとつ)

LDL: Low Density Lipoprotein の略。体内にコレステロールを運ぶ役割を担っている。悪玉コレステロールと呼ばれているが、悪ではない。LDL が必要以上に増えると酸化され上、動脈硬化の原因となる。

Chapter 25 ヘテロ環化合物 (その2)

(3) 芳香族性

その他の例
P.1219

練習問題 25-12 (p 1219)

練習問題 25-14 (p 1221)

トレンディーな話 : イオン液体

環境に優しい溶媒, 蓄電池, 医薬品, 宇宙で使える機械油 etc

Chapter 25 ヘテロ環化合物 (その3)

(4) ピリジン (電子不足しているヘテロ環の例)

ester と同じ程度に電子を引っつける

ピロールとの違いも把握すること。

(5) pyridine の反応

- Chichibabin 反応 P.1226

- Damishefski bisannulation 試薬

bisannulation 試薬の一般式

Synthetic Efforts of the Intermediate, Quinotoxine

J. Am. Chem. Soc. **1944**, *66*, 849.
J. Am. Chem. Soc. **1945**, *67*, 860.

Completely Stereocontrolled Synthesis of Quinine and Quinidine

Y. Kobayashi *et al.*, *Tetrahedron Lett.*, **2004**, 45, 3783; **2005**, 46, 6381

(酸性条件, アルカリ性条件下で安定な窒素原子の保護基。しかも, 保護機として従来用いられていた Ts 基よりも簡単に除去できる。)