問 1

区間 $[0,1]$ 上の一様分布に従う確率変数 X を考える。

ある確率密度関数 $p(x)$ が与えられた時、累積分布関数を

$$F(a) = \int_{-\infty}^a p(x) dx$$

とする。この関数が逆関数 $x = F^{-1}(y)$ を持つとき、確率変数 Y を $Y = F^{-1}(X)$ と定義する。

Y が確率密度関数 $p(x)$ に従うことを示せ。

問 2

X, Y が独立で、下の確率密度関数に従う確率変数であるとする。

$$p(x) = x \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \quad (x \geq 0)$$

このとき、次の Z と W の確率密度関数を求め、簡単に図示せよ。

(a) $Z = X^2$

(b) $W = X^2 + Y^2$

問 1

区間[0,1] 上の一様分布に従う確率変数 X を考える。
ある確率密度関数 $p(x)$ が与えられた時、累積分布関数を

$$F(a) = \int_{-\infty}^a p(x)dx$$

とする。この関数が逆関数 $x = F^{-1}(y)$ を持つとき、確率変数 Y を $Y = F^{-1}(X)$ と定義する。 Y が確率密度関数 $p(x)$ に従うことを示せ。

解答

Y の累積確率は定義より次のようになる。

$$\begin{aligned} P(Y \leq a) &= P(F^{-1}(X) \leq a) \\ &= P(F(F^{-1}(X)) \leq F(a)) \end{aligned}$$

問 2

X, Y が独立で、下の確率密度関数に従う確率変数であるとする。

$$p(x) = x \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \quad (x \geq 0)$$

このとき、次の Z と W の確率密度関数を求め、簡単に図示せよ。

- (a) $Z = X^2$
- (b) $W = X^2 + Y^2$

解答

X, Y の確率密度関数をそれぞれ $p_X(x), p_Y(x)$ とし、

$$p_X(x) = p_Y(x) = p(x)$$

$$(a) \quad p_Z(z) = \int_0^{\infty} \delta(z - x^2) p_X(x) dx$$

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{z} \\ \left| (z - x^2)' \right| &= |-2x| = 2\sqrt{z} \end{aligned}$$

$$p_Z(z) = \frac{p_X(\sqrt{z})}{2\sqrt{z}} = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{z}{2}\right) \quad (z \geq 0)$$

(b)

$Z_1 = X^2, Z_2 = Y^2$ とし、(a)の結果から Z_1, Z_2 の確率密度関数は下のようになる。しかも、 X, Y が独立であるから、 Z_1, Z_2 も独立な確率変数である。

$$\begin{aligned} &= P(X \leq F(a)) \quad * P(X \leq a) = F(a) = a \\ &= F(a) = \int_{-\infty}^a p(x)dx \end{aligned}$$

また Y が確率密度関数 $q(y)$ に従うとする。 Y の累積確率分布は

$$\int_{-\infty}^a q(y)dy$$

で与えられる。 Y の累積確率分布を a で微分すれば、

$$q(a) = p(a)$$

の関係が得られる。したがって Y が確率密度関数 $p(x)$ に従うことが示せた。

以上

$$p_{Z_1}(z) = p_{Z_2}(z) = p_Z(z)$$

したがって、

$$p_W(w) = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \delta(w - z_1 - z_2) p_{Z_1}(z_1) p_{Z_2}(z_2) dz_1 dz_2$$

$$\begin{aligned} z_1 = w - z_2 &\geq 0 \\ w &\geq z_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_W(w) &= \int_0^w p_{Z_1}(w - z_2) p_{Z_2}(z_2) dz_2 \\ &= \int_0^w \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{(w - z_2)}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{z_2}{2}\right) dz_2 \\ &= \frac{1}{4} \int_0^w \exp\left(-\frac{w}{2}\right) dz_2 = \frac{w}{4} \exp\left(-\frac{w}{2}\right) \quad (w \geq 0) \end{aligned}$$

以上

補足資料

$g'(x) = dg(x)/dx > 0$ として、 x_i を $g(x)$ のゼロ点、 ε を十分小さい正数とします。

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\delta(g(x))dx &= \sum_i \int_{x_i-\varepsilon}^{x_i+\varepsilon} f(x)\delta(g(x))dx \\ &= \sum_i \int_{x_i-\varepsilon}^{x_i+\varepsilon} f(x(g))\left(\frac{dx}{dg}\right)\delta(g)dg \\ &= \sum_i f(x_i)\left(\frac{dx}{dg}\right)\Bigg|_{x=x_i} = \sum_i \frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|} \quad (\because g' > 0)\end{aligned}$$

ここで $g'(x) < 0$ のときは

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\delta(g(x))dx &= \sum_i \int_{x_i-\varepsilon}^{x_i+\varepsilon} f(x)\delta(g(x))dx \\ &= \sum_i \int_{x_i-\varepsilon}^{x_i+\varepsilon} f(x(g))(g'(x))^{-1}\delta(g)dg \\ &= \sum_i \int_{x_i-\varepsilon}^{x_i+\varepsilon} f(x(g))(-|g'(x)|)^{-1}\delta(g)dg \\ &= \sum_i \int_{x_i+\varepsilon}^{x_i-\varepsilon} f(x(g))(|g'(x)|)^{-1}\delta(g)dg = \sum_i \frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|}\end{aligned}$$