

配布資料 5 : 繰り返しゲーム

(参考文献 12 「ゲーム理論」(岡田章著, 有斐閣) 205 - 232 ページ参照)

1. 繰り返しゲーム

(a) 成分ゲーム ( $n$  人戦略形ゲーム)

- $G = (N = \{1, \dots, n\}, \{X^i\}_{i \in N}, \{f^i\}_{i \in N})$ 
  - $N$ : プレイヤーの集合
  - $X^i$ : プレイヤー  $i$  の戦略の集合
  - $f^i: X = X^1 \times \dots \times X^n \rightarrow \mathfrak{R}$  プレイヤー  $i$  の利得関数
  - 注意
    - \*  $X^{-i} = X^1 \times \dots \times X^{i-1} \times X^{i+1} \times \dots \times X^n$
    - \*  $x^{-i} = (x^1, \dots, x^{i-1}, x^{i+1}, \dots, x^n) \in X^{-i}$

- 成分ゲームにおけるミニマックス行動  
成分ゲーム  $G = (N, \{X^i\}_{i \in N}, \{f^i\}_{i \in N})$  において,

$$\max_{x^i} f^i(x^i, \hat{x}^{-i}) = \min_{x^{-i}} (\max_{x^i} f^i(x^i, x^{-i}))$$

を満たす  $i$  以外のプレイヤーの行動の組  $\hat{x}^{-i} = (\hat{x}^1, \dots, \hat{x}^{i-1}, \hat{x}^{i+1}, \dots, \hat{x}^n)$  を ( $i$  以外のプレイヤーの)  $i$  に対する ミニマックス行動 という.  $\max_{x^i} f^i(x^i, \hat{x}^{-i})$  を  $i$  の ミニマックス利得 といい,  $v^i$  と書く.  $v = (v^1, \dots, v^n)$  を ミニマックス点 という.

- 成分ゲームにおける個人合理的行動  
行動の組  $x = (x^1, \dots, x^n)$  が 個人合理的  $\leftrightarrow f^i(x) \geq v^i \forall i = 1, \dots, n$   
行動の組  $x = (x^1, \dots, x^n)$  が 強く個人合理的  $\leftrightarrow f^i(x) > v^i \forall i = 1, \dots, n$
- 命題:  $G$  のナッシュ均衡を  $e = (e^1, \dots, e^n) \in X$  とすると,  $f^i(e) \geq v^i \forall i = 1, \dots, n$  である.

(b) 有限回繰り返しゲーム  $G^T$

- 成分ゲーム  $G$  を有限回 ( $T$  回) 繰り返す. 各プレイヤーは過去のプレイを完全に知る.
- プレイヤーの集合  $N$
- 各プレイヤー  $i$  の戦略
  - $t-1$  期目までの各プレイヤーの選択の結果をすべて知った上で,  $t$  期目の選択を行う.
  - $X_{t-1} = X \times \dots \times X$  ( $t-1$  個)  
 $X_0 = \{\emptyset\}$
  - $h_{t-1} = (x_1, \dots, x_{t-1}) \in X_{t-1}$ :  $t-1$  期目までの 履歴
  - $i$  の  $t$  期目の選択:  $s_t^i: X_{t-1} \rightarrow X^i$
  - $i$  の (純粋) 戦略  $s^i = (s_t^i)_{t=1}^T$
  - $i$  の戦略の全体  $X^{Ti}$ , 戦略の組  $(s^1, \dots, s^n)$  の全体  $X^T = X^{T1} \times \dots \times X^{Tn}$
- 各プレイヤー  $i$  の利得
  - 戦略の組  $s = (s^1, \dots, s^n)$  によって, 各期の選択の組が以下のように定まる

- \*  $x_1(s) = (s_1^1(\emptyset), \dots, s_1^n(\emptyset))$
- \*  $x_2(s) = (s_2^1(x_1(s)), \dots, s_2^n(x_1(s)))$
- \*  $x_t(s) = (s_t^1(x_1(s), \dots, x_{t-1}(s)), \dots, s_t^n(x_1(s), \dots, x_{t-1}(s))), t = 3, 4, \dots$
- 選択の組の列  $x(s) = (x_t(s))_{t=1}^T$  における各期の利得の割引因子  $\delta$  による 割引利得和

$$f^{Ti}(s) = \sum_{t=1}^T \delta^{t-1} f^i(x_t(s))$$

- (平均利得  $\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T f^i(x_t(s))$ )

- 成分ゲーム  $G$  の割引因子  $\delta$  を持つ  $T$  回繰り返しゲーム

$$G^T(\delta) = (N, \{X^{Ti}\}_{i \in N}, \{f^{Ti}\}_{i \in N})$$

- 定理: 毎回成分ゲームのナッシュ均衡を選択する戦略の組は  $T$  回繰り返しゲームのナッシュ均衡になり, 部分ゲーム完全均衡にもなる.
- 定理: 成分ゲームが唯一つのナッシュ均衡  $x^*$  を持つとする. このとき,  $T$  回繰り返しゲームの部分ゲーム完全均衡  $s^*$  は唯一つ存在し,  $x(s^*) = (x^*, \dots, x^*)$  である.

(c) 無限回繰り返しゲーム  $G^\infty$

- $i$  の (純粋) 戦略  $s^i = (s_t^i)_{t=1}^\infty$
- 選択の組の列  $x(s) = (x_t(s))_{t=1}^\infty$  における各期の利得の割引因子  $\delta$  ( $0 < \delta < 1$ ) による割引利得和  $\bar{f}^i(s) = \sum_{t=1}^\infty \delta^{t-1} f^i(x_t(s))$
- 正規化利得 (平均利得)  $(1 - \delta) \sum_{t=1}^\infty \delta^{t-1} f^i(x_t(s))$

(d) フォーク定理

- 無限回繰り返しゲームのナッシュ均衡

$G^\infty(\delta)$  において, 戦略の組  $s^* = (s^{*1}, \dots, s^{*n}) \in \bar{X}$  が ナッシュ均衡

$\leftrightarrow$  すべての  $i = 1, \dots, n$  に対して  $\bar{f}^i(s^*) \geq \bar{f}^i(s, s^{*-i}) \forall s^i \in \bar{X}^i$

- 定理 (フォーク定理): 成分ゲーム  $G$  の強く個人合理的な任意の行動の組  $x = (x^1, \dots, x^n)$  をとる. このとき,

$$\delta \geq \frac{\max_{y^i} f^i(y^i, x^{-i}) - f^i(x)}{\max_{y^i} f^i(y^i, x^{-i}) - v^i} \quad \forall i = 1, \dots, n$$

が成り立つならば, 繰り返しゲーム  $G^\infty(\delta)$  のナッシュ均衡  $s^* = (s^{*1}, \dots, s^{*n})$  が存在して  $x(s^*) = (x, x, \dots)$  が成り立つ.